

# Histoires Naturelles

n°15



**Le Pygargue à queue blanche, *Haliaeetus albicilla*,  
un oiseau nicheur de Rhône-Alpes, disparu au  
Moyen-âge**

Cyrille Deliry - Décembre 2010



# Le Pygargue à queue blanche, *Haliaeetus albicilla*, un oiseau nicheur de Rhône-Alpes, disparu au Moyen-âge

## **Nicheur disparu de la région (Moyen-Âge) et de France (1956)**

Cette espèce a dû raisonnablement nicher dans la région au Moyen-Âge selon Michelot (1991). La nidification très ancienne est envisagée en Savoie. On doit imaginer que ce rapace a niché au Moyen-Âge sur nos plus grands lacs, notamment le Bourget, voire le Léman, à l'instar des cas vraisemblables envisagés en Alsace entre les Xe et XVe siècles.

De Marole (1788) présente cet oiseau sous plusieurs noms : Sous Aigle à queue blanche, ne niche pas en France, on le trouve dans tous les pays du nord de l'Europe. Sous Orfraye ou Grand Aigle de mer<sup>1</sup>, se tient volontiers près des bords de mer. Salerne, en son temps, dit qu'il fait son nid sur les plus hauts chênes et qu'il en fut trouvé un dans le parc de Chambord, il parle aussi de deux de ces oiseaux tués (forêt d'Orléans et Sologne). Cet auteur connaît aussi deux oiseaux tués de la terre de Longny, en Perche.

Eteint depuis longtemps en France continentale (Yeatman 1971). A vraisemblablement niché au Moyen Age en Alsace entre les Xe et XVe siècles (Y.Gros, *com.*). Des indications du Moyen Age sont encore indiquées sur le Morbihan ([INPN 2010](#)). L'espèce était sédentaire en Basse Camargue selon Mayaud (1932), où selon l'auteur l'espèce se reproduisait jadis. Nicheur avéré sur les côtes orientales de Corse (Mayaud 1936). Ce sont jusqu'à 6 couple nicheurs qui sont indiqués sur l'île jusque dans les années 1930, tant sur la côte est (Biglglia et Palo) que sur la côte ouest (Campo del'Oro) (Dubois & *al.* 2008). Le dernier cas de nidification remonte à 1943 (Vansteenwegen 1998), encore probable en 1956, mais des individus isolés ont été indiqués jusqu'en 1966 (Dubois & *al.* 2008).

Le Pygargue ne niche plus en France, vers 1956, il est devenu un migrateur et hivernant très rare.

## **Internuptial en déclin en France, mais en reprise récente**

Pour le pays, Ménégaux (1932) souligne un double passage, notamment le long des côtes vers Abbeville, en février puis en octobre. Mayaud (1936) soulignait déjà le déclin de l'espèce, puisqu' dit l'oiseau de passage très rare, alors qu'autrefois il s'agissait d'un migrateur régulier en hiver (à partir d'octobre), le long des côtes, des fleuves et dans les régions des lacs et étangs. On ne voit plus à l'époque de Yeatman (1971) les hivernages qui permettaient des tableaux de chasse réguliers dans la Marne et en Touraine. De nouveaux cas d'hivernage, alors constatés complets, sont indiqués dans les années 1950 en Camargue, puis en Champagne humide dès les années 1970 (Dubois & *al.* 2008). Annoncés à 7-13 individus (1997), les effectifs sont stabilisés à 20-25 d'individus (2008), essentiellement en Champagne, depuis la fin des années 1990. Les

---

1 Avec quelques éléments de confusion dans la description avec le Gypaète barbu à mon avis (C.Deliry, *com.*) : barbe de plume lui pendant sous le menton. Noter que De Marole, parle très brièvement plus loin du Gypaète barbu, comme le *Laemmer Geyer* ou Vautour des agneaux, connu dans les montagnes de Suisse. Oiseau que Buffon et Salerne croient être le Condor du Pérou !

oiseaux sont présents dès fin septembre jusqu'au mois de mars.

En Rhône-Alpes, l'espèce n'était observée au XIXe siècle que lors des hivers les plus rigoureux, alors sur le Lac du Bourget, parfois sur le Rhône ou l'Isère (Bailly 1853-54). Un peu plus tard l'espèce est rare et de passage plus ou moins régulier en Dauphiné (Lavauden 1911).

### ***Nicheur en reprise en Europe, après un fort déclin***

Le déclin est très important au cours du XIXe et au début du XXe siècles en Europe. Pour la Norvège, qui est encore un bastion de l'espèce à la fin des années 1960, Yeatman (1971) indique le cas d'un seul homme qui parvint à en tuer cent en une année pour toucher la prime de destruction de 3 couronnes par tête. Les populations ont été détruites en Angleterre (nicheur disparu en 1908) et au Danemark (1910), les populations européennes sont en très forte réduction sous l'effet de persécution et des pesticides et son aire se rétracte progressivement vers l'est du continent (Yeatman 1971).

Le Pygargue est de nouveau en progression en Europe occidentale depuis les années 1970 et il a pu recoloniser certaines régions, notamment à partir des populations allemandes fortement protégées comme l'indique Yeatman (1971) à la fin des années 1960. L'espèce a disparu de divers secteurs : Irlande, Autriche, Corse, Sardaigne, Syrie, Irak, Israël et Egypte. La chasse, les empoisonnements, la pollution des eaux, les prélèvements d'œufs et de poussins ainsi que la destruction des zones humides sont autant de facteurs de menace.

On compte dans le Monde entre 20300 et 39600 individus (UICN 2010).

### ***Observations récentes dans la région Rhône-Alpes & Dauphiné***

Ces observations méritent d'être rassemblées. On trouve dans l'Ain diverses mentions hivernales, en Dombes notamment. D'autres mentions récentes de stationnement hivernal concernent le Lac du Bourget, en Savoie. Ailleurs il s'agit plus volontiers d'oiseaux de passage ou réalisant un court stationnement hivernal : le 16 février 2004 à Serre Ponçon (Hautes-Alpes), 1 immature du 5 au 14 décembre 1983 à l'Étang de Mépieu (Isère ; M.Ribiollet ; Pambourg & al. 1985) . Les mentions pour la Loire ou la Haute-Savoie restent à préciser.

## Références

**Bailly J.B. 1853-54** - *A préciser.*

**De Marole M. 1788** - *La Chasse au fusil.* - Imp. Barrois, Paris : 582 pp. & pl. > [\[www\]](#)

**Dubois P.J., Le Maréchal P., Oliosio G., Yesou P. 2008** - *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France.* - Del. & Niestl. : 560 pp.

**Lavauden 1911** - *A préciser.*

**Mayaud N. 1936** - *Inventaire des oiseaux de France.* - éd. Blot, Paris : 211 pp.

**Michelot J.L. 1991** - *A préciser.*

**Pambour B, Mure M., Villaret J.C. 1985** - Un peu de dépaysement hivernal en Ile Crémieu ou l'observation simultanée d'un Aigle criard (*Aquila clanga*) et d'un Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) sur le grand étang de Mépieu (Isère). - La Niverolle, 9 : 67-76.

**Vansteenwegen 1998** - *A préciser.*

**Yeatman L. 1971** - *Histoire des Oiseaux d'Europe.* - Bordas, Paris-Montréal : 367 pp.



# Histoires Naturelles © 2010

Les *Histoires Naturelles* rassemblent des informations et donnent un état des lieux aussi avancé que possible sur une question, un sujet, une liste d'espèces ou un catalogue... Elles ne traitent généralement que d'un seul sujet ou un seul thème à la fois.

## Illustration de couverture

*Haliaeetus albicilla* ♂ Planche de Naumann (XIXe siècle)

### Derniers numéros

- [n°1](#) - Expansion de la Libellule purpurine en France. *Trithemis annulata* (De Palisot de Beauvois, 1805).
- [n°2](#) - Liste des Orthoptères du département de l'Isère.
- [n°3](#) - Catalogue des Poissons de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°4](#) - Catalogue des Amphibiens de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°5](#) - Catalogue des Reptiles de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°6](#) - Catalogue des Oiseaux de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°7](#) - Catalogue des Mammifères de Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°8](#) - Biodiversité ou Biodiversités.
- [n°9](#) - Liste des Mammifères du Paléarctique Ouest.
- [n°10](#) - Histoire Naturelle des Ascalaphes.
- [n°11](#) - Ptéridophytes de la région Rhône-Alpes & Dauphiné.
- [n°12](#) - Eléments de Biodiversité dans la région Rhône-Alpes.
- [n°13](#) - Liste des Ephémères du département de l'Isère.
- [n°14](#) - Migration pour tous, migration partout.
- [n°15](#) - Le Pygargue à queue blanche, *Haliaeetus albicilla*, un oiseau nicheur en Rhône-Alpes, disparu au Moyen-Âge.