

Liste des Batraciens de Rhône-Alpes

Histoires Naturelles n°4



Liste des Batraciens de Rhône-Alpes

© 2009-2017 - Edition d'octobre 2017

Alytes obstetricans (Laurenti, 1758) - Alyte accoucheur - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun, en déclin. Ensemble de la région. Très localisé en Haute-Savoie. Plus abondante dans les Monts du Lyonnais et dans le Beaujolais, l'espèce est par ailleurs à tendances méridionales et manque dans les massifs les plus hauts.

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - Sonneur à ventre jaune - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Rare. Ensemble de la région. Très localisé en Ardèche.

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - Crapaud commun - 01 38 42 69 73 74 - Assez commun, en déclin. Partie septentrionale de la région.

Bufo spinosus Daudin, 1803 - Crapaux épineux - 01 07 26 38 42 69 - Essentiellement présent dans le domaine méditerranéen, l'acceptation récente de cette espèce permet de souligner que quelques populations se trouvent presque au nord de la région.

Epidalea calamita (Laurenti, 1768) - Crapaud calamite - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun. Le nombre de stations connues est limité dans certains départements (Ain, Savoie, nouvellement découvert en Haute-Savoie). Des populations originales et isolées se trouvent en altitude dans les hautes vallées comme en Maurienne (Savoie).

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - Rainette verte - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Rare et devenu localisé, en déclin sensible. Localisé dans la région, avec plusieurs départements ne présentant qu'un nombre limité de stations. Particulièrement bien représenté dans l'Isle Crémieu. Très localisé en Haute-Savoie (semblait autrefois plus abondante ; Thabuis 1872). Absent dans la Drôme, très rare en Ardèche et les Hautes-Alpes > *subsp. arborea*

Hyla meridionalis Boettger, 1874 - Rainette méridionale - 07 26 38^ 69^ - Espèce méridionale en limite de répartition, présente essentiellement en Drôme et Ardèche où elle tend selon les secteurs à être assez commune. Domaine méditerranéen (Ardèche, Drôme), introduite ou instable dans le domaine alpin.

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - Triton alpestre - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Peu commun, essentiellement en altitude.

Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1798) - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun. Semble absent des Hautes-Alpes.

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - Triton ponctué - 01 38 69 - Très rare et localisé (2 stations dûment connues en Isère, ailleurs très peu ou mal signalé désormais : indiqué dans l'Ain et le Rhône). Le déclin de l'espèce s'est notablement réduit au cours de la dernière décennie, suite à des actions ponctuelles de préservation comme à la RN du Grand Lemps (Isère). Il a été précédé d'un fort déclin sur la région. Semble disparu du domaine alpin, autrefois en Haute-Savoie. Bien confirmé mais épars en Dombes (Ain).

Lithobates catesbeiana (Shaw, 1802) - Grenouille taureau - (01^)(73) - Allochtone très rarement signalé (récent), reproduction inconnue dans la région, mentions en augmentation. Domaine alpin. Introductions accidentelles avec signalements ponctuels et irréguliers dans l'Ain et en Savoie. Taxon incertain dans la Drôme.

Pelobates cultripipes (Cuvier, 1829) - Pélobate cultripède - (07) 26 - Très rare. Domaine méditerranéen (? Ardèche et Drôme). Cinq localités isolées les unes des autres en Rhône-Alpes. Habitat relictuel, les populations sont extrêmement faibles. Pour l'essentiel à actualiser.

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - Pélobate brun - (74) - Disparu très anciennement de la région : données sub-fossiles. Néanmoins Thabuis (1872) le signalait aussi en Haute-Savoie.

Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Pélodyte ponctué - Assez rare mais répandu.

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) - Grenouille de Bedriaga - (73[^]) - Ranidae - Présence à confirmer dans la région lyonnaise (Rhône), alors échappé. Indiquée en Chautagne.

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) - Grenouille verte - 01 (07) (38) (42) (69) (73) - Semble assez commun. Taxon hybridogène mal connu. Mentions à actualiser.

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - Grenouille de Lessona - 01 **38** (42) (69) (73) 74 - Semble rare. Taxon du groupe des Grenouilles vertes protégé, mal connu qui semble menacé. Se trouve en général dans des stations isolées des autres Grenouilles vertes.

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - Grenouille rieuse - **01 07 26 38 42 69 73 74** - En augmentation et favorisé par des introductions et une colonisation active, ce taxon peut être considéré comme invasif, menaçant les populations autochtones des autres Grenouilles vertes par pollution génétique. Il tend à être devenu commun de la plaine à moyenne altitude.

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Grenouille agile - Peu commun à assez commun selon les secteurs.

Rana temporaria Linnaeus, 1758 - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Grenouille rousse - Commun plus particulièrement en altitude. Les populations de plaines sont en déclin sensible et devenues rares. Ensemble de la région, rare dans la Drôme.

Salamandra atra Laurenti, 1768 - Salamandre noire - 74 - Très rare. Déclin probable à l'échelle séculaire (a pu habiter la Savoie et l'Isère, incertain). Désormais seulement en Haute-Savoie (Haut-Giffre, à actualiser pour le secteur de Chamonix).

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - Salamandre tacheté - 01 07 26 38 42 69 73 74 - Assez commun, en déclin.

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - Triton italien - 01 74 - Allochtone rare, mentions en augmentation. Introduit depuis le Canton de Genève (Suisse). Une dizaine de stations connues en Haute-Savoie, dont la progression est à surveiller.

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - Triton crêté - 01 **07** 26 38 42 69 73 74 - Rare. Disséminé et tendance à l'isolement des populations dans la

région. Celle de Notre-Dame-de-l'Osier (Isère) est tout à fait remarquable. Très localisé en Ardèche, dans la Drôme et en Haute-Savoie (moins de 5 stations pour chacun de ces départements).

Références

ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed. 2003 - *Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg*. - Coll. Parthénope, éd. Biotope, Mèze (France) : 480 pp.

Castanet J. & Guyétant R. (dir.) 1989 - *Atlas de la répartition des Amphibiens et Reptile de France*. - SHF, Paris : 191 pp.

Deliry C. (coord.) 2002 - Reptiles et Amphibiens de Rhône-Alpes. Atlas préliminaire. - *Le Bièvre*, hors série n°1 : 146 pp.

Duquet M. & Maurin H. 1992 - *Inventaire de la faune de France. Vertébrés et principaux Invertébrés*. - MNHN, Nathan : 415 pp.

Frost, Darrel R. 2006 (Internet) - *Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 4 (17 August 2006)*. - American Museum of Natural History, New York, USA.

Gasc J.P. (dir.) 1997 - *Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe*. - SEH, MNHN, Paris : 496 pp.

INPN 2005 - *Inventaire National du Patrimoine Naturel. Tableau de référence de la faune*. - (6 septembre 2005).

Maurin H. (dir.) 1994 - *Inventaire de la faune menacée de France*. - WWF, MNHN, Nathan, Paris : 176 pp.

Histoires Naturelles

© 1999-2017

Les *Histoires Naturelles* rassemblent des informations et donnent un état des lieux aussi avancé que possible sur une question, un sujet, une liste d'espèces ou un catalogue... Elles ne traitent généralement que d'un seul sujet ou un seul thème à la fois.

Illustration de couverture

Grenouille rousse (*Rana temporaria*)

Tourbière de Malpas (Doubs)

© C.Deliry

